

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Глицерин

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Глицерин

Международное непатентованное или группировочное наименование: глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

Один суппозиторий содержит:

Дозировка 1,24 г

Действующее вещество: глицерол (в пересчете на 100 % вещество) — 1,24 г.

Вспомогательные вещества: натрия стеарат — 0,10 г, вода очищенная — 0,20 г.

Дозировка 2,11 г

Действующее вещество: глицерол (в пересчете на 100 % вещество) — 2,11 г.

Вспомогательные вещества: натрия стеарат — 0,17 г, вода очищенная — 0,35 г.

Описание

Суппозитории прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичные, торпедообразной формы. Допускается помутнение суппозитория, незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание контурной упаковки. На срезе допускается наличие воздушного стержня.

Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство.

Код АТХ: A06AX01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Слабительное средство. При применении в виде ректальных суппозиториях смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке. Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулирует моторику кишечника, инициирует процесс дефекации, облегчает прохождение и выведение каловых масс.

Фармакокинетика

Плохо всасывается при ректальном применении.

Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 2 до 18 лет:

- для симптоматического лечения запоров различной этиологии (когда использование пероральных препаратов невозможно);
- для профилактики запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глицеролу или любому из компонентов препарата.

Синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит, беременность (I триместр), детский возраст до 2 лет.

С осторожностью

Почечная недостаточность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Следует избегать применения в I триместре беременности.

Во время беременности применение препарата возможно только в том случае, если, по мнению врача ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Период грудного вскармливания

В период грудного вскармливания применение препарата возможно.

Способ применения и дозы

Ректально.

Вводят препарат в прямую кишку и оставляют там не менее 5 минут. Обычно дефекация происходит через 5–10 минут после введения препарата. Остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 суппозиторию, содержащему 2,11 г глицерола, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозитория в сутки.

Детям с 2 до 12 лет назначают по 1 суппозиторию, содержащему 1,24 г глицерола, 1 раз в сутки.

Перед и после применения суппозитория необходимо тщательно вымыть руки.

Не следует применять препарат более 7 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, *необходимо проконсультироваться с врачом*. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): очень часто ($>1/10$), часто ($>1/100$, $<1/10$), нечасто ($>1/1000$, $<1/100$), редко ($>1/10000$, $<1/1000$), очень редко ($<1/10000$), частота неизвестна (не может быть установлена по имеющимся данным).

Нарушения со стороны иммунной системы

Частота неизвестна: аллергические реакции.

Общие нарушения и реакции в месте введения

Частота неизвестна: местные реакции (зуд, жжение в области ануса), появление спастических болей в области кишечника, при длительном применении — ослабление физиологического процесса дефекации.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, *сообщите об этом врачу*.

Передозировка

Симптомы: частый жидкий стул.

Лечение: отмена препарата, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные по взаимодействию с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не установлено.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные, 1,24 г, 2,11 г.

По 5 или 6 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

АО «Фармпроект», Россия,

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А.

Телефон: +7 (812) 331 93 10

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Фармпроект», Россия,

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А.

Телефон: +7 (812) 331 93 10