

Листок-вкладыш – информация для пациента

**Фурацилин, 20 мг, таблетки для приготовления раствора для местного
и наружного применения**

Действующее вещество: нитрофурал

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Фурацилин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Фурацилин.
3. Применение препарата Фурацилин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Фурацилин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Фурацилин, и для чего его применяют

Препарат Фурацилин содержит действующее вещество нитрофурал, относится к фармакотерапевтической группе «антисептики и дезинфицирующие средства; производные нитрофурана».

Показания к применению

Препарат Фурацилин применяется у взрослых и детей по следующим показаниям:

- Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II степени, мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).
- Местно: блефарит, конъюнктивит, острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

Способ действия препарата Фурацилин

Препарат содержит действующее вещество нитрофурал, которое вызывает гибель бактерий и простейших микроорганизмов, способных вызывать инфекции у человека.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Фурацилин

Противопоказания

Не применяйте препарат Фурацилин:

- если у Вас аллергия на нитрофурал, производные нитрофурана или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас кровотечения в месте применения;
- если у Вас аллергические заболевания кожи (аллергодерматозы);
- если у Вас выраженные нарушения функции почек.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Фурацилин проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Сообщите врачу, если у Вас имеется нарушение функций почек, так как при применении препарата Фурацилин при тяжелых ожогах на больших поверхностях, возможно прогрессирование почечной недостаточности (уремия, нарушение водно-электролитного баланса, метаболический ацидоз).

Другие препараты и препарат Фурацилин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата Фурацилин при беременности и кормлении грудью возможно только в крайних случаях, которые определяет врач.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

3. Применение препарата Фурацилин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Водный 0,02 % раствор нитрофурала готовят непосредственно перед применением.

1 таблетку (20 мг) растворяют в 100 мг дистиллированной или кипяченой воды.

Для более быстрого растворения рекомендуется кипящая или горячая вода. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры.

Наружно

Орошают раны, пролежни, ожоги II степени, мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы) и накладывают влажные повязки.

Местно

Блефарит, конъюнктивит — инстиляция раствора в конъюнктивальный мешок.

При остром тонзиллите, стоматите, гингивите — полоскание рта и горла теплым раствором по 100 мл 2–3 раза в день.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Фурацилин и **немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих признаков **аллергической реакции**:

- аллергическое воспаление кожи (дерматит);
- зуд кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

5. Хранение препарата Фурацилин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до...».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Фурацилин содержит

Действующим веществом является нитрофурал.

Каждая таблетка содержит 20 миллиграмм нитрофурала.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: натрия хлорид.

Внешний вид препарата Фурацилин и содержимое упаковки

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения.

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности, плоскоцилиндрической формы с риской.

По 5, 10, 15, 20, 25 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата (листом-вкладышем) в пачке из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «без рецепта».

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Фармпроект»

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А

Телефон: +7 (812) 331 93 10

Электронная почта: sales@pharmproject.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Фармпроект»

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А

Телефон: +7 (812) 331 93 10

Электронная почта: sales@pharmproject.com

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза <https://grls.rosminzdrav.ru>.